



### Avant la grossesse

- **Prise de sang conseillée pour :**
  - Groupe sanguin + RAI (Recherche d'Agglutinine Irrégulière)
  - TSH (si facteur de risque de dysthyroïdie, difficultés de procréation, parcours PMA)
  - Toxoplasmose
  - CMV
  - Rubéole
  - VIH (population à risque)
- **Dépistage du cancer du col de l'utérus** (si le dernier a été effectué il y a 3 ans)
  - PCR HPV si la femme est âgée de plus de 30 ans ou examen anatomopathologique si la femme est âgée de moins de 30 ans



en savoir plus



en savoir plus

### Grossesse 1er trimestre

- **Prise de sang pour :**
  - **Toxoplasmose**
  - **CMV (Tous les mois jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée si la patiente est séronégative)**
  - **Rubéole**
  - **Dépistage syphilis**
  - **Rhésus foetal à partir de la 11ème semaine si mère RhD- et conjoint +**
  - VIH (proposé systématiquement)
  - Hépatite B (antigène HBs)
- **Détermination du groupe sanguin / RAI**
- **TSH (si facteur de risque de dysthyroïdie, difficultés de procréation, parcours PMA)**
- Glycémie à jeun (si facteur de risque de diabète gestationnel)
- **Analyse de la glycosurie et la protéinurie**
- Dépistage T21



en savoir plus

### Grossesse 2ème trimestre

- **Prise de sang pour :**
  - **Toxoplasmose (tous les mois si la patiente est séronégative)**
  - **Rubéole (si négative à la première prise)**
- **Analyse de la glycosurie, de la protéinurie (avec créatinurie et rapport urinaire protéine sur créatinine RPC)**
- **Dépistage infection urinaire asymptomatique à la bandelette urinaire**
- **ECBU - Examen Cytobactériologique des Urines**  
**Si antécédents d'infection urinaire, diabète ou BU+**
- **Rubéole (à 20 semaines d'aménorrhée en cas de négativité du résultat précédent)**
- Rattrapage du dépistage T21 s'il n'a pas été fait au 1er trimestre
- Dépistage diabète gestationnel par HGPO 75g (au 6ème mois si facteur de risque)
- Prévention dépression post-partum



### Grossesse 3ème trimestre

- **Prise de sang pour :**
  - **Toxoplasmose (si négative à la première prise)**
- **Analyse de la glycosurie, de la protéinurie (avec créatininurie et rapport urinaire protéine sur créatinine RPC)**
- **NFS (Numération Formule Sanguine) et RAI**
- Dépistage mensuel infection urinaire asymptomatique à la bandelette urinaire
- Prélèvement vaginal avec recherche de streptocoque B
- Prévention dépression post-partum

### Après la naissance - 1ères semaines

- Prise de sang pour la toxoplasmose si la patiente est séronégative
- En cas de diabète gestationnel - glycémie à jeun ou HGPO
- **Dépistage du cancer du col de l'utérus** (si le dernier a été effectué il y a 3 ans)
- Prévention dépression post-partum

### Bébé grandit : 3 à 9 mois

- Prise de sang selon prescription médicale
- Prévention dépression post-partum

### Bébé grandit : 9 mois à 2 ans

- Prise de sang selon prescription médicale



Au cours de la période des 1 000 premiers jours, de nombreux professionnels peuvent intervenir auprès des parents et de l'enfant. La liste des professionnels de santé mentionnés dans les documents n'est pas exhaustive.